## Indicadores epidemiológicos e operacionais de hanseníase
## Brasil 2000 - 2018

| Indicadores / Ano | Casos novos < 15 anos | Taxa de detecção < 15 anos por 100 mil habitantes | Casos novos geral | Taxa de detecção geral por 100 mil habitantes | Casos em registro ativo 31/12 de cada ano | Taxa de prevalência por 10 mil habitantes | % de cura nas coortes | % de contatos examinados | % de avaliados quanto ao GIF no diagnóstico | % Grau 2 nos casos novos avaliados no diagnóstico | Taxa de GIF 2 por 1 milhao habitantes | % de avaliados quanto ao GIF na cura | Unidades de saúde com pacientes em tratamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3.378 | 6,72 | 43.196 | 25,44 | 79.933 | 4,71 | 83,0 | 60,9 | 83,2 | | 1,52 | 57,8 | 3.327 |
| 2001 | 3.555 | 6,96 | 45.874 | 26,61 | 68.812 | 3,99 | 81,6 | 68,0 | 84,7 | 6,0 | 14,00 | 64,7 | 3.895 |
| 2002 | 3.862 | 7,47 | 49.438 | 28,33 | 75.624 | 4,33 | 75,8 | 52,7 | 84,2 | 5,9 | 14,70 | 63,1 | 4.640 |
| 2003 | 4.181 | 7,98 | 51.900 | 29,37 | 79.908 | 4,52 | 69,3 | 43,9 | 84,9 | 5,6 | 14,50 | 60,9 | 5.493 |
| 2004 | 4.075 | 7,68 | 50.565 | 28,24 | 30.693 | 1,71 | 67,3 | 45,5 | 84,8 | 5,8 | 14,60 | 60,4 | 5.847 |
| 2005 | 4.010 | 7,34 | 49.448 | 26,86 | 27.713 | 1,48 | 69,2 | 49,7 | 85,5 | 5,8 | 14,20 | 58,9 | 6.526 |
| 2006 | 3.444 | 6,22 | 43.642 | 23,37 | 26.338 | 1,41 | 85,5 | 43,8 | 86,6 | 5,7 | 13,20 | 60,6 | 6.988 |
| 2007 | 3.048 | 6,07 | 40.126 | 21,19 | 41.549 | 2,11 | 81,1 | 49,8 | 83,0 | 9,4* | 17,20* | 55,1 | 7.323 |
| 2008 | 2.913 | 5,89 | 39.047 | 20,59 | 39.115 | 2,06 | 81,3 | 54,7 | 88,2 | 7,7 | 14,00 | 67,8 | 7.492 |
| 2009 | 2.669 | 5,43 | 37.610 | 19,64 | 38.179 | 1,99 | 82,1 | 59,8 | 89,3 | 7,2 | 12,70 | 71,8 | 8.015 |
| 2010 | 2.461 | 5,36 | 34.894 | 18,22 | 29.761 | 1,56 | 82,3 | 57,7 | 89,4 | 7,2 | 11,70 | 72,9 | 9.155 |
| 2011 | 2.420 | 5,22 | 33.955 | 17,65 | 29.690 | 1,54 | 82,7 | 58,9 | 89,5 | 7,1 | 11,30 | 72,9 | 9.445 |
| 2012 | 2.246 | 4,81 | 33.303 | 17,17 | 29.311 | 1,51 | 85,9 | 74,5 | 88,6 | 7,6 | 11,50 | 71,3 | 9.593 |
| 2013 | 2.439 | 5,03 | 31.044 | 15,44 | 28.445 | 1,42 | 84,0 | 75,1 | 88,1 | 7,3 | 9,90 | 69,9 | 8.944 |
| 2014 | 2.341 | 4,88 | 31.064 | 15,32 | 25.738 | 1,27 | 82,7 | 76,6 | 87,0 | 6,6 | 10,10 | 70,9 | 8.579 |
| 2015 | 2.113 | 4,46 | 28.761 | 14,07 | 20.702 | 1,15 | 83,5 | 78,2 | 87,1 | 7,5 | 9,20 | 71,22** | 8.846 |
| 2016 | 1.696 | 3,63 | 25.218 | 12,23 | 22.710 | 1,10 | 81,8 | 77,6 | 87,3 | 7,9 | 8,42 | 69,9** | 8.213 |
| 2017 | 1.718 | 3,72 | 26.875 | 12,94 | 28.064 | 1,35 | 81,2 | 78,9 | 87,1 | 8,3 | 9,39 | 68,9** | 8.035 |
| 2018 | 1.705 | 3,75 | 28.660 | 13,70 | 30.882 | 1,48 | 80,6 | 81,4 | 86,5 | 8,5 | 10,08 | 68,3** | 9.051 |

Fonte: Sinan/SVS-MS ; Tabela elaborada pela CGDE/DCCI/SVS-MS

Legenda: GIF= Grau de Incapacidade Física

* Grau de incapacidade em 2007 influenciado pela mudança no Sistema de Informação.

** indicador avaliado no período das Coortes

**Parâmetros:**

| Coeficiente de detecção em < 15 anos | Coeficiente de detecção pop. Geral | Coeficiente de prevalência | % de avaliação de incapacidades físicas | % de grau 2 de incapacidade física | % de contatos examinados | % de cura nas Coortes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hiperendêmico** ≥ 10,00/100.000 hab. | **Hiperendêmico** ≥ 40,00/100.000 hab. | **Hiperendêmico** ≥ 20,00/10.000 hab. | **bom** ≥ 90,0% | **alto** ≥ 10,0% | **bom** ≥ 75,0% | **bom** ≥ 90,0% |
| **Muito Alto** 5,00 a 9,99/100.00 hab. | **Muito Alto** 20,00 a 39,99/100.000 hab. | **Muito Alto** 10,00 a 19,99/100.000 hab. | **regular** 75,0 a 89,9% | **médio** 5,0 a 9,9% | **regular** 50,0 a 74,9% | **regular** 75,0 a 89,9% |
| **Alto** 2,50 a 4,99/100.000 hab. | **Alto** 10,00 a 19,99/100.000 hab. | **Alto** 5,00 a 9,99/10.000 hab. | **precário** < 75,0 | **baixo** < 5,0% | **precário** < 50,0 | **precário** < 75,0 |
| **Médio** 0,50 a 2,49/100.000 hab. | **Médio** 2,00 a 9,99/100.000 hab. | **Médio** 1,00 a 4,99/10.000 hab. | | | | |
| **Baixo** < 0,50/100.000 hab. | **Baixo** < 2,00/100.000 hab. | **Baixo** < 1,00/10.000 hab. | | | | |